Impfungen gegen Grippe, Covid-19, RSV, Pneumokokken – für wen und wann?

Tabelle 1. Empfohlene Zielgruppen für die Impfungen bzw. Immunisierung (vereinfachter Überblick)

Zielgruppe (Empfehlungskategorie)	**Grippe (Influenza)**	**Covid-19**	**RSV**	**Pneumokokken**
Siehe auch: www.bag.admin.ch/...	...influenza-de	...covid-19-de	...rsv	...pneumokokken-erkrankungen
Ältere Erwachsene (ergänzende Impfung)	Ab **65 Jahren**	Ab **65 Jahren**	Ab **75 Jahren** (aktuell **nicht** von der OKP vergütet)	Ab **65 Jahren**
Gesunde Neugeborene und/oder **Gesunde Säuglinge** (passive Immunisierung/Basisimpfung)	–	–	**Monoklonale Antikörper** für Neugeborene und Säuglinge bis **12 Monate** für die erste RSV-Saison nach der Geburt	**Säuglinge** ab 2 Monaten Nachholimpfung bis 1 Tag vor dem 5. Geburtstag (< 59 Monate), Impfschema altersabhängig
Kinder mit Risikofaktoren (Impfung/Immunisierung für Risikogruppen)	Ab **6 Monaten** gemäss Impfplan: **Frühgeborene:** die ersten zwei Winter nach der Geburt **Personen mit Grunderkrankungen:** Immundefizienz (inkl. Neoplasien, Transplantationen), Lungen-, Herz-Kreislauf-, neurologische, muskulo-skelettale, hämatologische, Nieren- u. Leber-Erkrankungen, Asplenie, Funktionsstörung der Milz, Stoffwechsel-Störungen, BMI ≥ 40 **Personen** in Heimen und Pflege-einrichtungen	Ab **16 Jahren** gemäss Impfplan: definierte Schweregrade von Immundefizienz (inkl. Neoplasien, Transplantationen); Lungen-, Herz-Kreislauf-, Nieren- u. Leber-Erkrankungen sowie Diabetes mellitus; Sichelzell-Krankheit, BMI ≥ 35, Trisomie 21	**Monoklonale Antikörper** bis **24 Monate** für Frühgeborene und bei Grunderkrankungen gemäss Impfplan für die ersten zwei Winter nach Geburt	Ab **2 Monaten** gemäss Impfplan: **Frühgeborene** (Grundimmunisierung) **Personen mit Grunderkrankungen:** definierte Schweregrade von Immundefizienz (inkl. Neoplasien, Transplantationen, HIV), Lungen-, Herz-, Nieren- (inkl. nephrotisches Syndrom), Lebererkrankungen sowie Diabetes mellitus, Asplenie (inkl. Sichelzell-Krankheit), Cochleaimplantat, Schädelbasisfraktur/-fehlbildung, zerebrospinale Liquorfistel sowie Zöliakie bei Erwachsenen
Erwachsene mit Risikofaktoren bzw. bestimmten Grunderkrankungen, die zu einem schweren Verlauf oder Komplikationen führen können (Impfung für Risikogruppen)			Ab **65 Jahren** bzw. ab **18 Jahren** (bei sehr hohem Risiko) gemäss Impfempfehlung: definierte Schweregrade von Immundefizienz (inkl. Neoplasien, Transplantationen, HIV), Lungen-, Herz-Kreislauf-, neurologische, neuro-muskuläre, Nieren-, hämato-logische Erkrankungen, Diabetes mellitus, Gebrechlichkeit und Personen in Heimen/Pflegeeinrichtungen (aktuell **nicht** von der OKP vergütet)	
Schwangere (Impfung für Risikogruppen zum Schutz der Schwangeren bzw. maternale Impfung zur passiven Immunisierung des Neugeborenen)	**Gesamte Schwangerschaft** und Frauen, die in den letzten 4 Wochen entbunden haben: zum Schutz der Schwangeren und indirekt des Neugeborenen	**Mit Grunderkrankung*** zum Schutz der Schwangeren **Ohne Grunderkrankung**, wenn Impfung nach einer individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung als medizinisch indiziert erachtet wird	**Schwangere ab 18 Jahren** in **SSW 32+0 bis 36+0** maternale Impfung zur passiven Immunisierung des Neugeborenen	–
Enge Kontaktpersonen von Risikopersonen und **Berufliche Indikation**	Bei **regelmässigem Kontakt** zu oben genannten Personengruppen, Säuglingen sowie Wildvögeln/Geflügel	–	–	–

* Chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, chronische Nierenerkrankungen, chronische Lebererkrankungen, Diabetes mellitus, Adipositas, neurologische Erkrankungen und Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen.

Informationen zur Kostenübernahme von Impfungen und Impfstoffen durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung (Grundversicherung) finden Sie auf der BAG-Webseite «Kostenübernahme bei prophylaktischen Impfungen»: www.bag.admin.ch/prophylaktische-impfungen

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

Den Schutz immer dabei.

Tabelle 2. Empfohlene Zeitpunkte und Impf-/Immunisierungsschemata

Zielgruppe	Grippe (Influenza)	Covid-19	RSV	Pneumokokken
Siehe auch: www.bag.admin.ch/...	...influenza-de	...covid-19-de	...rsv	...pneumokokken-erkrankungen
Ältere Erwachsene **Erwachsene mit Risikofaktoren** gemäss Tabelle 1	Ab **65 Jahren** oder **bei Risikofaktoren** Jährlich: **1 Dosis** ab **Mitte Oktober bis zum Beginn der Grippewelle** **Impfstoffe:** Eflueldа® (ab 65 Jahren), Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip® Ab 75 Jahren bzw. ab 65 Jahren mit zusätzlichen Risikofaktoren ist ein Hochdosis-Impfstoff vorzuziehen.	Ab **65 Jahren** oder **bei Risikofaktoren** Jährlich: **1 Dosis** im Herbst (**ab September**) **Impfstoffe:** Comirnaty®, Spikevax®	Ab **75 Jahren** oder **bei Risikofaktoren** **1 Dosis** ab **Oktober bis November**, spätestens jedoch vor Beginn der RSV-Welle **Impfstoffe:** Abrysvo®, Arexvy®, mResvia® (aktuell **nicht** von der OKP vergütet)	Ab **65 Jahren: 1 Dosis** **Impfstoffe:** Capvaxive®, Prevenar® 20 **18–64 Jahre mit Risikofaktoren: 1 Dosis** **Impfstoff:** Capvaxive®
Gesunde Neugeborene und/oder **Gesunde Säuglinge**	–	–	Neugeborene geboren zwischen **Oktober und März: 1 Antikörperdosis*** in der **ersten Lebenswoche** oder so bald wie möglich danach **Säuglinge** geboren zwischen **April und September: 1 Antikörperdosis** im **Oktober** oder so bald wie möglich danach **Monoklonale Antikörper:** Nirsevimab (Beyfortus®), Clesrovimab (Enflonsia®)	**3 Dosen** im Alter von 2, 4 und 12 Monaten **Impfstoffe:** Prevenar® 13, Vaxneuvance® Nachholimpfung bis 1 Tag vor dem 5. Geburtstag (< 59 Monate), Impfschemata siehe unten
Kinder mit Risikofaktoren gemäss Tabelle 1	**Frühgeborene** ab dem Alter von **6 Monaten** für die ersten 2 Winter nach der Geburt sowie **Kinder mit Risikofaktoren:** Jährlich: **1 Dosis** ab **Mitte Oktober bis zum Beginn der Grippewelle** **Impfstoffe:** Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip®	–	**Frühgeborene** und **bei Grunderkrankungen** bis **24 Monate**: **1 Antikörperdosis** auch vor ihrem zweiten Winterhalbjahr, im **Oktober** oder so bald wie möglich danach **Monoklonaler Antikörper:** Nirsevimab (Beyfortus®)	**Frühgeborene** und **Säuglinge mit Grunderkrankung** < 7 Monate: **4 Dosen** Nachholimpfschemata gemäss Alter bei 1. Impfdosis: - 7–11 Monate: 3 Dosen - 12–23 Monate: 2 Dosen - ab 24 Monate: 1 Dosis **Impfstoffe** gemäss Alter: 2–59 Monate: Prevenar® 13, Vaxneuvance® 5–17 Jahre (6–17 Jahre off-label): Prevenar® 20, Vaxneuvance®
Schwangere	Gesamte Schwangerschaft und Frauen, die in den letzten 4 Wochen entbunden haben: **1 Dosis** ab **Mitte Oktober bis zum Beginn der Grippewelle** **Impfstoffe:** Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip®	Gesamte Schwangerschaft, präferentiell im 2. oder 3. Trimester: **1 Dosis** **Impfstoffe:** Comirnaty®, Spikevax®	**1 Dosis*** maternale **Impfung in SSW 32+0 bis 36+0**, wenn der errechnete Geburtstermin zwischen Anfang Oktober und Ende März liegt **Impfstoff:** Abrysvo®	–
Enge Kontaktpersonen von Risikopersonen und **Berufliche Indikation**	Jährlich: **1 Dosis ab Mitte Oktober bis zum Beginn der Grippewelle** **Impfstoffe:** Eflueldа® (ab 65 Jahren), Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip®	–	–	–

* Schwangere sollen informiert entscheiden, ob sie zum Schutz ihres Neugeborenen (passive Immunisierung) die maternale Impfung während der Schwangerschaft **oder** die Immunisierung ihres Neugeborenen nach der Geburt mit monoklonalen Antikörpern bevorzugen.